

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

3.16 PREDIO LIBRE DE TUBERCULOSIS: Predio con ganadería bovina y/o bufalina, verificada como negativa, a través de las pruebas diagnósticas de campo para Tuberculosis bovina y que por ello ha sido certificado como libre de la enfermedad por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

3.17 PRUEBA DE TUBERCULINA O HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA: Esta prueba constituye un método de diagnóstico de referencia para la detección de la Tuberculosis bovina. Se fundamenta en medir el grosor de la piel, posterior a la aplicación intradérmica de la tuberculina bovina y/o aviar, y determinar cualquier cambio de grosor o inflamación en el sitio de la aplicación.

3.18 PRUEBA DE TUBERCULINA PLEGUE ANO-CAUDAL (PAC): Es la prueba de tuberculina básica de rutina utilizada como prueba tamiz, consiste en la aplicación vía intradérmica de un derivado proteico purificado (DPP) de origen bovino en el centro del tercio medio del pliegue ano-caudal interno, posteriormente se realiza la lectura de la prueba 72 ± 6 horas posteriores a la aplicación.

3.19 PRUEBA DE TUBERCULINA CERVICAL COMPARATIVA (PCC): Prueba diagnóstica de campo empleada para confirmar la infección por *Mycobacterium bovis*. Se aplican dos tipos de tuberculina: DPP bovina y DPP aviar las cuales son aplicadas vía intradérmica, en el tercio medio del cuello. Se realiza la lectura de la prueba 72 ± 6 horas posteriores a la aplicación.

3.20 PRUEBA DE TUBERCULINA CERVICAL SIMPLE (PCS): Prueba de diagnóstico utilizada para la detección y eliminación de animales infectados por *Mycobacterium bovis* en predios en los que ya se ha comprobado la infección a través de las pruebas mencionadas anteriormente. La tuberculina DPP bovina, es aplicada vía intradérmica, en el tercio medio del cuello. Se realiza la lectura de la prueba 72 ± 6 horas posteriores a la aplicación.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

3.21 TUBERCULINA: Es un derivado proteico purificado (DPP) y filtrado obtenido del crecimiento de un *Mycobacterium spp* en un medio de cultivo líquido, que induce una respuesta de hipersensibilidad retardada en animales que se han expuesto a diferentes especies de *Mycobacterium*.

3.22 TUBERCULOSIS BOVINA (TBB): Enfermedad transmisible, producida por el agente *Mycobacterium bovis*, que evoluciona hacia la forma crónica en el bovino, bufalino, otros animales domésticos y silvestres e incluso en el hombre, por lo cual es considerada una zoonosis. Afecta principalmente los sistemas respiratorio y digestivo y se caracteriza por el desarrollo progresivo de lesiones llamadas granulomas o tubérculos.

ARTÍCULO 4.- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA. La presencia de la enfermedad de tuberculosis en ganado bovino y bufalino se definirá mediante las siguientes pruebas contempladas dentro del Programa de Control y Erradicación de Tuberculosis bovina:

- 4.1. Hipersensibilidad retardada: Prueba Ano-Caudal, Cervical Comparativa y Prueba Cervical Simple.
- 4.2. Otras pruebas que determine el ICA.

ARTÍCULO 5. - TUBERCULINA. Los derivados proteicos purificados a implementar para la detección de animales infectados por *Mycobacterium spp*. son:

5.1. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO DPP BOVINO: Elaborado con extracto de proteínas de filtrados de cultivos de *Mycobacterium bovis*. Es utilizado para las pruebas ano-caudal, cervical simple y cervical comparativa. Su concentración debe ser entre veinte mil (20.000) a veinticinco (25.000) UI por mL.

5.2. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO DPP AVIAR: Elaborado con extracto de proteínas de filtrados de cultivos de *Mycobacterium avium*. Es utilizada para la prueba cervical comparativa. Su concentración debe ser de veinticinco mil (25.000) UI por mL.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

ARTÍCULO 6.- APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE TUBERCULINA. Las pruebas de tuberculina solo podrán ser realizadas por Médicos Veterinarios o Médicos Veterinarios y Zootecnistas del ICA, o adscritos a Organismos de Inspección Autorizados por el Instituto Colombiano Agropecuario para el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis bovina, reservándose el ICA el derecho de repetir las pruebas de tuberculina cuando lo considere necesario.

Los tipos de pruebas serán los siguientes:

6.1. PRUEBA EN EL PLIEGUE ANO-CAUDAL (PAC): aplicación vía intradérmica de un DPP de origen bovino a una dosis de 0.1 mL (2000-2500 UI), inyectado en el centro del tercio medio del pliegue ano-caudal interno, posteriormente se realizará la lectura de la prueba a las 72 ± 6 horas, la cual será interpretada de la siguiente manera:

6.1.1 REACCIÓN NEGATIVA: Cuando no se presente inflamación o cuando se observe una leve inflamación con un incremento de espesor del pliegue de la piel menor de 2 mm.

6.1.2 REACCIÓN DUDOSA: Aumento de grosor del pliegue cutáneo de 2 a 4 mm, el cual podrá estar acompañado por algún signo clínico como edema difuso, exudación, necrosis, dolor o inflamación de los ganglios linfáticos de la zona de aplicación de la tuberculina.

6.1.3 REACCIÓN POSITIVA: Aumento de grosor del pliegue cutáneo mayor a 4 mm.

PARÁGRAFO. Esta prueba se aplicará solo en procesos de certificación de predios libres y vigilancia epidemiológica en explotaciones bovinas.

6.2. PRUEBA CERVICAL SIMPLE: Aplicación vía intradérmica, de un DPP de origen bovino a una dosis de 0.1 mL (2000-2500 UI), inyectado en el tercio medio del cuello, posteriormente se realizará la lectura de la prueba a las 72 ± 6 horas, la cual será interpretada de la siguiente manera según la especie y proceso:

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

6.2.1 REACCIÓN NEGATIVA: Cuando no se presente inflamación o cuando se observe una leve inflamación con un incremento de espesor de la piel, menor de 2 mm.

6.2.2 REACCIÓN POSITIVA: Aumento de grosor del pliegue cutáneo mayor a 2 mm, la cual podrá estar acompañado por signos clínicos como edema, exudación, necrosis, dolor o inflamación de los ganglios y conductos linfáticos de la zona de aplicación de la tuberculina.

PARÁGRAFO. Esta prueba se realizará en los procesos de certificación de predios libres y vigilancia epidemiológica en la especie bufalina y en los procesos de saneamiento en la especie bovina.

6.3. PRUEBA CERVICAL COMPARATIVA: Aplicación vía intradérmica, de un DPP de origen bovino, y uno de origen aviar, inyectados en el tercio medio del cuello, a una distancia entre una y otra de aproximadamente 12-15 centímetros, una dosis de 0.1 mL (2000-2500 UI) de DPP bovino y 0.1 mL (2500 UI) DPP aviar respectivamente. En animales jóvenes, en los que no hay espacio para separar los puntos lo suficiente en un solo lado del cuello, debe aplicarse una inyección a cada lado del cuello en puntos equivalentes. La interpretación de los resultados está basada en la diferencia del tamaño de la reacción de la tuberculina bovina comparada con la tuberculina aviar, las cuales se interpretarán así:

6.3.1 REACCIÓN NEGATIVA: La diferencia entre el engrosamiento inducido por los DPP bovina con respecto a la DPP aviar es menor a 1 mm.

6.3.2 REACCIÓN DUDOSA: La diferencia entre el engrosamiento inducido por los DPP bovina con respecto a la DPP aviar esta entre 1 y 4 mm.

6.3.3 REACCIÓN POSITIVA: La diferencia entre el engrosamiento inducido por los DPP bovina con respecto a la DPP aviar es superior a 4 mm.

PARÁGRAFO. Dos resultados consecutivos a la prueba cervical comparativa como reactor sospechoso se considerarán positivo.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

PARÁGRAFO 1. Los funcionarios del ICA-INVIMA deberán realizar la inspección de canales y tomar muestras de tejido de los animales faenados, con destino al Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario-LNDV, como proceso integral a la vigilancia epidemiológica del predio infectado.

PARÁGRAFO 2. El destino de las canales de los animales beneficiados será definido de acuerdo al dictamen emitido por el funcionario de INVIMA, encargado de la supervisión del faenado.

PARÁGRAFO 3. Las plantas de beneficio públicas o privadas, colaborarán con las autoridades sanitarias en el faenado de los animales que deban ser sacrificados por Tuberculosis bovina, acorde con lo estipulado en la resolución 00043 del 18 de febrero de 2002 emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO 4. Los animales de especies domesticas susceptibles a Tuberculosis bovina, que se encuentren en los predios con ganaderías infectadas, deberán ser sometidos a los procedimientos sanitarios establecidos por el ICA.

ARTICULO 8.- INDEMNIZACIÓN POR BENEFICIO DE ANIMALES POSITIVOS:

El propietario de los animales positivos a Tuberculosis bovina, tendrá derecho a recibir indemnización previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el ICA. El monto de la indemnización estará de acuerdo con las características del animal (raza, sexo, edad, potencial de producción, condiciones fisiológicas y valor genético) equivalente al 60% del valor comercial del bovino o bufalino a beneficiar, sin exceder la suma de tres salarios mínimos mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00043 del 18 de Febrero de 2002 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de aquella que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 9.- PRUEBA A UTILIZAR EN LOS PREDIOS DE EXPLOTACIÓN BOVINA EN PROCESO DE SANEAMIENTO.

En predios de explotaciones bovinas que se encuentren en proceso de saneamiento, la prueba de diagnóstico a utilizar es la prueba cervical simple.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

PARÁGRAFO. En situaciones especiales en las cuales no se haya podido determinar el estado de infección del animal por *Mycobacterium bovis* con la prueba cervical simple, los responsables del programa de Tuberculosis tanto a nivel nacional como seccional, determinaran mediante un análisis integral del predio, el uso de pruebas complementarias de diagnóstico.

ARTÍCULO 10.- PRUEBA A UTILIZAR EN LOS PREDIOS DE EXPLOTACIÓN BUFALINA EN PROCESO DE SANEAMIENTO. En predios de explotaciones bufalinas que se encuentren en proceso de saneamiento, la prueba de diagnóstico a utilizar es la prueba cervical simple. Si resultan animales reactores positivos, se confirmaran con una prueba cervical comparativa a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la primera prueba.

PARÁGRAFO. En situaciones especiales en las cuales no se haya podido determinar el estado de infección del animal por *Mycobacterium bovis*, con la prueba cervical comparativa, los responsables del programa de Tuberculosis tanto a nivel nacional como seccional, determinaran mediante un análisis integral del predio, el uso de pruebas complementarias de diagnóstico.

ARTÍCULO 11.- TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO. Para la terminación del proceso de saneamiento del predio y el levantamiento de la cuarentena de que trata la presente resolución, todos los animales bovinos y/o bufalinos mayores de seis (6) semanas de edad, una vez que hayan pasado cuarenta y cinco (45) días desde que el último animal positivo haya sido sacrificado, deberán reportar resultados negativos a dos (2) pruebas de tuberculina cervical simple con un intervalo de seis (6) meses.

PARÁGRAFO 1. Se prohíbe el uso y comercialización de semen bovino o bufalino procedente de predios infectados.

PARÁGRAFO 2. En caso que el ICA compruebe la violación de las normas sanitarias sobre control y erradicación de la Tuberculosis Bovina de que trata la presente resolución, no habrá lugar a indemnización alguna por concepto de sacrificio de animales declarados positivos a la enfermedad, acorde con lo estipulado en la resolución 00043 del 18 de febrero de 2002 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

ARTÍCULO 12.- CERTIFICACION DE PREDIO LIBRE DE TUBERCULOSIS BOVINA. La certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina es de carácter voluntario con excepción de las explotaciones bovinas y bufalinas que se encuentren registradas en asociaciones de razas puras, las que asistan a exposiciones y remates de ganados puros y las destinadas a programas de reproducción para mejoramiento genético, recolección y comercialización de semen o embriones, las cuales están en la obligación de obtener por parte del ICA la mencionada certificación previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución.

ARTÍCULO 13.- DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PREDIOS LIBRES DE TUBERCULOSIS BOVINA. Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener la certificación de su predio como libre de Tuberculosis bovina, deberán presentar la solicitud ante a la oficina local del ICA en la cual se encuentre registrado su predio y diligenciar la forma que para dicho fin tenga establecido el instituto, anexando la siguiente información:

- 13.1 Certificado de registro sanitario de predio pecuario RSPP.
- 13.2 Censo actualizado de los animales ubicados en el predio.
- 13.3 Registros de ingresos y egresos de animales al predio.
- 13.4 Identificación del 100% de los animales del predio a certificar. (IDENTIFICA)

PARÁGRAFO 1. Cuando la solicitud se realice a través de un OIA, este deberá anexar la forma que tenga establecido el instituto para el ingreso al programa de predios libres de tuberculosis bovina debidamente diligenciada por el interesado, la lista de chequeo para certificación de predios libres de Tuberculosis bovina, la información establecida en los numerales 13.1 a 13.4 de la presente resolución y los resultados negativos a las pruebas de tuberculina que acrediten la evaluación y verificación del resultado diagnóstico a la enfermedad.

PARÁGRAFO 2. El interesado en obtener la certificación de su predio como libre de tuberculosis bovina, podrá acercarse al ICA para recibir información sobre el esquema del proceso, tiempos, compromisos y tarifas del mismo.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

ARTÍCULO 14.- PREDIO LIBRE DE TUBERCULOSIS BOVINA. Se considerará que un predio es Libre de Tuberculosis Bovina, cuando el 100% de los bovinos y/o bufalinos mayores de seis (6) semanas de edad obtengan resultados negativos a los siguientes procesos:

14.1 ESPECIE BOVINA: Dos pruebas de tuberculina ano-caudal con un intervalo de cuatro (4) meses.

Si en la primera prueba ano-caudal resultan animales reactivos positivos y sospechosos, se confirmarán con una prueba cervical comparativa a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la aplicación de la primera prueba.

Si los resultados son negativos, a los cuatro (4) meses se realizará la segunda prueba ano-caudal.

Si en la segunda prueba ano-caudal resultan animales reactivos positivos y sospechosos, se confirmarán con una prueba cervical comparativa a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la aplicación de la segunda prueba.

Si los resultados son positivos, el predio entrará en proceso de saneamiento conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución.

14.2 ESPECIE BUFALINA: Dos pruebas de tuberculina cervical simple con un intervalo de cuatro (4) meses.

Si en la primera prueba cervical simple resultan animales reactivos positivos, se confirmarán con una prueba cervical comparativa a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la aplicación de la primera prueba.

Si los resultados son negativos a los cuatro (4) meses se realizará la segunda prueba cervical simple.

Si en la segunda prueba cervical simple resultan animales reactivos positivos, se confirmarán con una prueba cervical comparativa a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la aplicación de la segunda prueba.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

Si los resultados son positivos, el predio entrara en proceso de saneamiento conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución.

PARÁGRAFO. Los predios que se encuentran ubicados en los municipios que hacen parte del programa especial contrato plan Nariño en el departamento de Nariño y el acuerdo 015 del 28 de febrero del 2014 en el departamento de Caquetá, se podrán certificar, hasta la finalización del convenio, con una (1) prueba de tuberculina ano-caudal al 100% de los animales mayores de seis (6) semanas de edad, con resultados negativos.

ARTICULO 15. TRAMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. La Oficina Local del ICA en la cual se encuentra registrado el predio, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de los resultados negativos a las pruebas de tuberculina o de la radicación de la solicitud realizada por el Organismo de Inspección Autorizado, revisará la información y documentos relacionados en el artículo 13 de la presente resolución. Cuando haya lugar a aclaraciones de la información, la Oficina Local del ICA podrá conceder un plazo máximo hasta de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación, para que el interesado de cumplimiento a lo solicitado.

Vencido este término si el interesado no ha aclarado la información se considerará que desiste de la solicitud y el ICA procederá a la devolución de la misma con sus respectivos soportes, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en la presente resolución.

Como resultado de la revisión de la información y documentos relacionados en el artículo 13 de la presente resolución, se emitirá un concepto técnico que podrá ser favorable o desfavorable y formara parte integral del soporte para la expedición de la certificación.

Si el concepto técnico es favorable, la correspondiente Oficina Local del ICA expedirá la certificación de predio libre de tuberculosis bovina.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

Si el concepto técnico es desfavorable, se comunicará por escrito al interesado y se hará devolución de toda la documentación presentada por el mismo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente resolución.

ARTICULO 16.-EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. La Oficina Local del ICA en la cual se encuentra registrado el predio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la emisión del concepto técnico favorable, expedirá la certificación de predio libre de tuberculosis bovina, la cual tendrá una vigencia de un (1) año.

ARTÍCULO 17.- DE LA RECERTIFICACIÓN. Para la recertificación de predio libre de tuberculosis bovina, el interesado deberá solicitar la misma, a la oficina local del ICA con mínimo un (1) mes de antelación al vencimiento de la certificación, anexando los documentos de que trata el artículo 13 de la presente resolución. La certificación podrá ser renovada mediante los siguientes procesos:

17.1 ESPECIE BOVINA: Una prueba de tuberculina ano-caudal realizada al 100% de los animales mayores de seis (6) semanas de edad que obtengan resultados negativos. Si se encuentran animales reactores positivos o sospechosos, se confirmará con una prueba cervical comparativa aplicada cuarenta y cinco (45) días después de la aplicación de la prueba ano – caudal.

17.2 ESPECIE BUFALINA: Una prueba de tuberculina cervical simple realizada al 100% de los animales mayores de seis (6) semanas de edad que obtengan resultados negativos. Si se encuentran reactores positivos, se confirmará con una prueba cervical comparativa aplicada cuarenta y cinco (45) días después de la aplicación de la prueba cervical simple.

PARÁGRAFO. En los predios donde se obtengan resultados reactores positivos a la prueba cervical comparativa, se establecerá una cuarentena oficial y deberán ingresar al proceso de saneamiento según lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

ARTÍCULO 18.- PROCESO DE VACIO. Los predios certificados como libres de Tuberculosis bovina que realicen la movilización del 100% de sus animales (proceso de vacío), perderán su estatus como libre.

Los ganaderos deberán notificar e informar por escrito a la oficina local ICA y al Organismo de Inspección Autorizado que realizó el proceso de certificación, la movilización de sus animales tres (3) días antes de realizarla.

Si el repoblamiento del predio se hace con animales procedentes de un predio libre de tuberculosis, se realizará una (1) prueba de tuberculina según la especie, inmediatamente ingresen al predio. Si la prueba es negativa, el predio recuperará su estatus.

Si el repoblamiento se realiza con animales procedentes de un predio sin estatus de libre, iniciará un nuevo proceso de certificación conforme se encuentra establecido en la presente resolución.

Los predios certificados como libres de Tuberculosis bovina que realicen la movilización del 100% de sus animales a un predio vacío, deberán realizar una (1) prueba de tuberculina según la especie, a todos los animales mayores de cuarenta y cinco (45) días de edad, la cual se deberá realizar a los seis (6) meses posteriores a su ingreso para conservar su estatus.

PARÁGRAFO. En los predios en donde se obtengan resultados positivos a la prueba cervical comparativa, se establecerá una cuarentena oficial y deberán ingresar al proceso de saneamiento según lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución.

ARTÍCULO 19.- BONIFICACIÓN. Las plantas acopiadoras y procesadoras de productos lácteos, deberán exigir a sus proveedores el certificado de Predio Libre de Tuberculosis bovina otorgado por el ICA y cumplir con el pago de la bonificación sanitaria obligatoria para los productores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o aquella que la modifique o sustituya.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

ARTÍCULO 20.- MOVILIZACIÓN DE ANIMALES. Todos los bovinos y bufalinos mayores de seis (6) semanas de edad que se movilicen a predios libres de Tuberculosis bovina y a ferias de exposición, deben presentar resultado negativo a la prueba diagnóstica de la tuberculina con validez no mayor a cuarenta y cinco (45) días.

PARÁGRAFO 1. Solo se permitirá la movilización de bovinos y bufalinos hacia zonas declaradas como libres de tuberculosis bovina, cuando estos provengan de predios certificados como libres de la enfermedad o cuenten con un resultado negativo a la prueba Cervical Comparativa, con validez no mayor a cuarenta y cinco (45) días.

PARÁGRAFO 2. No se exigirán pruebas de Tuberculina a los ganados de lidia a muerte y a los bovinos o bufalinos que se movilicen con destino a predios sin estatus de libre, plantas de beneficio, mercados ganaderos, ferias comerciales y subastas.

ARTÍCULO 21.- DE LOS INSUMOS. Los insumos utilizados para diagnóstico del *M.bovis*, como lo son la tuberculina, los kits y reactivos diagnósticos utilizados en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación, serán controlados por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA en las fases de comercialización y uso, en cuanto a calidad y cumplimiento de la normatividad vigente.

PARÁGRAFO. Los laboratorios comercializadores y/o importadores de tuberculina, kits y reactivos diagnósticos, registrados ante el ICA, son los responsables de mantener a disposición el biológico, en los lugares y calidad que determine el ICA

ARTÍCULO 22.- IMPORTACIÓN DE BOVINOS Y BUFALINOS. Los bovinos y bufalinos importados deberán ser sometidos a la prueba cervical simple de tuberculina.

En caso de presentarse animales positivos se procederá a confirmar con la prueba cervical comparativa. Si resultan reactores positivos se eliminarán.

RESOLUCIÓN No.
()

“Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para el Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en las especies bovina y bufalina en Colombia y los requisitos para la certificación de predio libre de Tuberculosis Bovina”.

Los animales contacto se mantendrán bajo observación en el lugar de cuarentena y se les realizará la prueba de tuberculina a los cuatro (4) meses posteriores a la eliminación de los animales positivos.

Si la prueba es negativa, se liberará la cuarentena de importación.

ARTÍCULO 23.- OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN. Todas las personas naturales o jurídicas que tengan conocimiento o sospecha de cuadros clínicos o patológicos compatibles con Tuberculosis bovina, están en la obligación de informar de manera inmediata al ICA.

ARTÍCULO 24.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Los propietarios, administradores o responsables de las plantas de beneficio públicas o privadas deben permitir la presencia de los médicos veterinarios del ICA para la realización de la vigilancia epidemiológica de Tuberculosis bovina.

ARTÍCULO 25.- CONTROL OFICIAL. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una copia en el lugar.

PARÁGRAFO. Los propietarios y/o administradores de predios pecuarios están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 26.- SANCIONES. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en el Capítulo 10 del Título I de la Parte 13 del Decreto 1071 de 2015, y la sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

