

PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE GRANOS DE ARROZ CON CÁSCARA PARA CONSUMO ORIGINARIOS DE ESTADOS UNIDOS

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de granos de arroz con cáscara (*Oryza sativa*) para consumo originarios de Estados Unidos.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Estados Unidos que consigne lo siguiente:

2.1. Declaración adicional:

“El envío viene libre de para *Alternaria padwickii*, *Aspergillus heterocaryoticus*, *Albifimbria verrucaria*, *Curvularia aerea*, *Curvularia senegalensis*, *Exserohilum rostratum*, *Fusarium acuminatum*, *Fusarium sporotrichioides*, *Helicoceras oryzae*, *Syncephalastrum racemosum*, *Tilletia barclayana* y *Tilletia horrida* mediante certificado de laboratorio Nro. “.....” (Escribir el número de diagnóstico de laboratorio)”.

2.2. Tratamiento fitosanitario:

Opción 1.

Tratamiento fitosanitario de desinfestación en preembarque para *Alphitobius diaperinus*, *Cadra cautella*, *Corcyra cephalonica*, *Cryptolestes pusillus*, *Latheticus oryzae*, *Lissorhoptrus oryzophilus*, *Plodia interpunctella*, *Stegobium paniceum*, *Tenebroides mauritanicus*, *Trogoderma variabile* y *Typhaea stercorea* con fosforo de aluminio al 56% en las siguientes dosis:

Dosis, g PH ₃ m ⁻³	Tiempo de exposición mínimo		Temperatura mínima
	Productos contenidos en bolsas o sacos apilados	Productos almacenados a granel o en silo	
3	10 días	12 días	10°C
3	7 días	9 días	20°C

Opción 2.

Tratamiento fitosanitario de desinfestación en preembarque para *Alphitobius diaperinus*, *Cadra cautella*, *Corcyra cephalonica*, *Cryptolestes pusillus*, *Latheticus oryzae*, *Lissorhoptrus oryzophilus*, *Plodia interpunctella*, *Stegobium paniceum*, *Tenebroides mauritanicus*, *Trogoderma variabile* y *Typhaea stercorea* con Bromuro de Metilo en las siguientes dosis:

Tratamiento: T302-e-3—MB (sólo etiqueta “Q”) lona o cámara.

Temperatura (°F)	Dosage Rate (lbs/1000 ft ³)	Minimum Concentration Readings (ounces) AT (x) hours:							
		0.5	2	4	5	6	7	8	10
80-96	2.5	30	20	20	15				
70-79	3.0	36	24	24	18				
60-69	3.0	36	24	24			17		
50-59	3.0	36	24	24		17		17	
40-49	3.0	36	24	24		17		17	17

AVISO

Cualquiera de las opciones antes mencionadas como tratamientos fitosanitarios, puede ser aplicada u otro producto de similar acción en dosis adecuadas.

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso